



涼しげな葉姿が人気！

シマトネリコは、もともと熱帯～亜熱帯の山地に自生する高木ですが、比較的寒さにも強い近年人気の樹木です。半常緑樹ですので寒い地域では葉を落とします。

5月に枝先や葉のつけ根に円錐状の花序をつくり長さ2～3mmの白い花をつけます。夏になると長さ3cm程の細長い翼状に発達した実(翼果)が多数熟します。

成長が早いですが刈り込みに強く樹形は保てます。

■シマトネリコ モクセイ科

MB3000 株立 2.5m前 ¥24,700/株

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

分類	常緑～半常緑高木
植栽最適地	関東南部～九州
水	普通
日照	日向



葉のイメージ



花のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期					■							
実の鑑賞								■	■	■		
剪定				■							■	
肥料		■	■									



出荷のイメージ



花のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。見た目が悪くだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



赤い果実が愛らしい。

革質の葉はあまり密に生えず、風が吹くと触れ合っ
てソヨソヨと音をたてることから名前の由来となっ
ています。10月頃、小さな赤い実がたくさんつきます。
但し、雌雄異株なので、果実を鑑賞するには雌株を購
入する必要があります。(お届け商品は雌株ですが100%
結実するという保証はございません)


日陰にも耐え、樹形が自然に整い、萌芽力もあり刈
込にも耐えるので初心者向けの樹木でもあり、また刈
り込むことで洋風・和風いずれの庭にも合わせられる
ので庭づくりのベテランの方まで楽しめます。

■ソヨゴ モチノキ科

MB3011 株立 1.8 ~ 2.0m前後 雌株
¥33,000/株

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

分類	常緑小高木
植栽最適地	東北南部～沖縄
水	普通
日照	半日陰～日向



葉のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期						■						
実の鑑賞										■	■	■
剪定			■	■	■							
肥料	■											



樹形イメージ



樹形イメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

常緑ヤマボウシ (ホンコンエンシス)

Cornus hongkongensis



■ 常緑ヤマボウシ ミズキ科

MB3024 ¥33,400/株 株立2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)



葉のイメージ



実のイメージ



樹形イメージ



寒冷地域では冬になると葉が赤くなることがありますが、春には新芽が息吹ます。

1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種。

関東では冬に多少落葉して、紅葉も楽しめます。(ただし植栽する環境によっては寒さで落葉したり、紅葉しない場合があります) 果実は食用になります。1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種です。

常緑ヤマボウシはこれといって剪定をしなくても、自然と形が整うので、剪定は必要最低限にとどめておきます。ただし、あまりに茂らせていると風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなります。半日陰でも生育しますが、花が減りますので出来るだけ日当たりで育てて下さい。

分類	常緑高木
植栽最適地	東北南部～九州
水	普通
日照	半日陰～日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実と紅葉									実		紅葉	
剪定												
肥料												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



北海道でも自生する、寒さに強い落葉樹。

大きくなってくると幹にシラカバのような白い模様が現れるのも人気です。

アオダモのアオの由来は雨上がりに樹皮が緑青色になる事、枝を水に浸けて暫くすると水が青い蛍光色になる事、高級感を出すために黒墨に加えて青墨を作るための着色剤として利用された事等、青い染料に利用された事によると言われています。プロ野球選手のバッドでも有名な木です。

水不足になると、水の蒸発とのバランスを取るために落葉することがありますが、水やりの頻度を増やすと回復します。

■アオダモ モクセイ科

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道～九州
水	控えめ
日照	半日陰～日向

★ **MB3607** ￥19,800/本 単木2～2.5m前後
(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

★…山採 その他…畑もの〔注〕画像は株立ちです。

別名：コバノトネリコ・アオタコ



樹形イメージ



幹肌イメージ



葉のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
剪定												
肥料												
植付適宜												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

イロハモミジ *Acer palmatum* ●●



紅葉が美しく、和風洋風問わないのも人気。

葉は長さ 3.5 ~ 6cm、幅 3 ~ 7cm で、掌状に深く 5 ~ 9 裂し、和名は、この裂片を「いろはにほへと……」と数えたことに由来しています。

イロハモミジは比較的日陰に強い樹木ですが、綺麗な紅葉には夏の日照時間と昼夜の寒暖差、土地の乾燥が重要になりますので、建物の陰になるような場所に植えると生育に影響が出ることがあります。

■イロハモミジ ムクロジ科
MB3580 ¥19,800/株 株立 2.0m前後

分類	落葉小高木・高木
植栽最適地	北海道南部～沖縄(種による)
水	普通
日照	日向

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)



葉のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
葉の紅葉												
剪定												
肥料												



紅葉のイメージ



花のイメージ

☐害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。
 見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、
 薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



野趣あふれる樹形と紅葉が魅力です。

葉がハウチワカエデの半分程度と小さいのでこう呼ばれています。別名のイタヤメイゲツのイタヤは、葉がイタヤカエデと同様に、板で葺いた屋根のように向こうが見えないほど、びっしりと生い茂り、美しい丸い葉を月に見立てたものだそうです。

秋の紅葉は赤ではなく、美しく鮮やかな黄葉です。

乾燥に弱いので夏は庭植えでも水をあげてください。根元に日が当たらないようにグランドカバーをするのがポイントです。

■コハウチワカエデ ムクロジ科

MB3635 ¥22,000/株 株立20～24m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

[注] 画像は単木です。

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道南部～沖縄(種による)
水	控えめ(乾燥に弱い)
日照	半日陰～日向



樹形イメージ

別名：イタヤメイゲツ



幼葉のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
葉の紅葉												
剪定												
肥料												
植付適宜												



葉のイメージ

害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



白花が清楚な花木。

日本原産種で、別名「ナツツバキ」と呼ばれ、初夏にツバキに似た白い清楚な花を横向きに咲かせます。成長は早いですが、萌芽力が低いため剪定は嫌います。土の乾燥を嫌い、また強い日差しを受けると葉焼けすることがあります。

また、観賞以外にも美しい樹皮が床や柱などに利用されることもあります。

■シャラ ツバキ科

MB3540 ¥20,900/株 株立18～20m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4.現在)

別名：ナツツバキ



花のイメージ



葉のイメージ



樹形イメージ



分類	落葉高木
植栽最適地	東北南部～九州
水	普通
日照	日陰～半日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
葉の紅葉												
剪定												
肥料												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

ジューンベリー Amelanchier canadensis ●●



無農薬栽培も可能なのでホームフルーツに最適です。

4月、葉が出る前に白い花を華やかに咲かせます。
6月に熟す果実は食用になります。花つきもよく実もよくなります。
管理も手がかからず、またすっきりした樹姿が人気の花木です。また、秋には紅葉し、四季を楽しめる樹木です。

■ジューンベリー バラ科

MB3532 ¥19,200/株 株立18～2m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4.現在)

別名：アメリカザイフリボク

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道西部～九州
水	普通
日照	半日陰～日向



花のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料												



樹形イメージ



秋のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



シャラより小型の花を咲かせる。

樹皮は滑らかで淡赤黄色～淡赤褐色を帯びて光沢があります。秋になると美しく紅葉します。

近縁のシャラによく似ていますが、花はシャラより小型です。

適度に湿った土壌を好むので、幹や根元に日があたらないようにすると丈夫に育ちます。成長は早いですが、萌芽力が低いため剪定は嫌います。

■ヒメシャラ ツバキ科

MB3590 ¥19,800/株 株立 1.8~2m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4在)

分類	落葉高木
植栽最適地	関東～九州
水	普通
日照	日陰～半日向




幹肌のイメージ



イメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
葉の紅葉												
剪定												
肥料												



樹形イメージ



花後と葉

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。



■落葉ヤマボウシ ミズキ科 ミズキ属
MB3560 ¥16,000/株 株立 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(202.4 現在)

放任でも美しい樹形に。

5～6月に、25～30個の小花が球状に集まって咲き、その周りに4枚の大型の花弁のような白い総苞片が付き、まるで白い大型の花が咲いたように見えます。

秋には美しく紅葉し直径1～1.5cmのまるい果実が赤く熟し、果実は食用になります。

生長はやや早く、萌芽力もあり剪定にも耐えますが、ほとんど剪定せずに美しい自然樹形となります。

分類	落葉高木
植栽最適地	東北～九州
水	普通
日照	半日陰～日向



花のイメージ



実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実と紅葉								実			紅葉	
剪定												
肥料												



樹形イメージ



花と葉のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いただけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

クロモジ Lindera umbellata



上に伸びる幹の姿が楚々とし、和も洋の庭にも合う。

若枝の樹皮に入る黒い斑紋が美しく、文字のように見えることが和名の由来です。

クロモジはお湯をかけておくとよい香りを放つことから、枝を編んでつくられる「黒文字垣」はお茶室の垣根などに、枝を削ったものは茶事に出される菓子楊枝や取り箸の「黒文字」として使われてきました。

日陰を好む樹種となりますので、植え込みにはご注意ください。日を当てる時間は、2～3時間程度で十分です。


とても育てやすい樹木ですので、初めて植える樹木にもぴったりです。

■クロモジ クスノキ科

MB3711 ¥19,800/株 株立 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

別名: トリシバ、アブラギ、ウシヨウ



新芽と花 イメージ

分類	落葉低木
植栽最適地	岩手県以南～九州
水	普通
日照	日陰～半日陰

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料												
植付適宜												

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。



「黒文字」イメージ



日本版ブルーベリー！と呼ばれています。

自生地では、林縁の斜面地などに生育していますので、栽培するときは、水はけがよく乾きすぎない西日の当たらない日向から半日陰を選びましょう。

花や果実を觀賞するだけでなく、果実を生食やジャムなどに加工して楽しむブルーベリーの仲間、近年人気の高い植物です。果実は房状に数多くなるので、ジャムにすると作りごたえがあります。

また、紅葉も美しく、姿も野趣に富んでおりますので、和洋を問わず庭植えすることが可能です。

■ナツハゼ ツツジ科

MB3730 ¥17,600/株 株立 1.8～2.5m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2022.4 現在)

別名: ゴンスケハゼ、ヤロコハチマキ



イメージ

分類	落葉低木
植栽最適地	北海道～九州
水	普通
日照	半日陰～日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期												
実の鑑賞												
剪定												
肥料												
植付適宜												

☐害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。